

浅谈产科护理工作中常见安全隐患分析及防范对策 分析

鲁微伟

(商南县医院 陕西 商洛 726300)

摘要:目的:探究产科护理工作中最为常见的安全隐患以及防范措施进行简要的分析,并希望可以促进在患者看护下的容错率的发生,并为后续研究人员提供相关参考。方法:选取 2019 年 1 月-2019 年 12 月在产科进行治疗的患者 100 例作为本次研究的对象,根据患者的入住时间输入到 Excel 表格中进行单双数分组,单数记为对照组,应用常规护理方法,双数记为研究组,研究组在对照组的基础上进行预防护理措施方式,比较两组患者应用的护理模式对临床成效的影响。结果:两组患者在进行护理看护后,病情变化情况据有所改进,其中研究组患者的生活质量大的改变程度优于对照组。结论:在产科对患者进行治疗时,适用预防措施看护方式进行辅助,有利于患者的临床症状缓解,提高患者的生活质量。

关键词: 产科护理; 安全隐患; 护理措施

1 资料与方法

1.1 一般资料

取 2019 年 1 月-2019 年 12 月在产科进行治疗的患者 100 例作为本次研究的对象,根据患者的入住时间输入到 Excel 表格中进行单双数分组,单数记为对照组,应用常规护理方法,双数记为研究组,研究组在对照组的基础上进行预防护理措施方式,比较两组患者应用的护理模式对临床成效的影响,都可以发现病患的基本资料与研究结果之间并没有密切的联系,两组患者的一般情况详见表 1,两组患者一般资料,差异有统计学意义 ($P>0.05$)。

表 1 两组患者的一般情况

组别	例数	性别		平均年龄	学历		居住环境	
		男	女		专科	本科	城市	农村
研究组	50	20	30	25.78 ± 1.24	25	25	20	30
对照组	50	25	25	27.45 ± 1.45	30	20	25	25

纳入标准:(1)患者及家属同意本次研究;(2)本次研究经过本院伦理委员会的统一;(3)符合本次研究的产科患者。

排除标准:(1)患有严重的肺部感染;(2)血液系统、神经系统疾病等;(3)不可以与人进行沟通。

1.2 方法

两组病患在入院进行诊治之后均已经接受检查和基础诊治,主要的诊治内容包含有药物治疗基本诊治手段。对照组患者的看护措施主要为常规看护方式。研究组则在对照组的基础上预防措施方式进行干预,其具体内容包括心理干预,饮食干预,健康教育,社会支持等。(1)心理干预方面,与妊娠阶段的妇女会逐渐出现紧张、焦虑、不安等负面情绪,再加上部分病患对妇产科病痛的了解程度相对较低,

所以治疗的依从性比较差,这时看护人员需要与她们进行合理的沟通排解她们存在的负面情绪,使其保持良好的心理状态。(2)饮食看护方面,看护人员根据病患的病情发展情况以及饮食爱好制定针对性的饮食计划。(3)健康教育方面,定时定期的向其详细讲解病痛的知识,治疗的注意事项以及愈后内容。(4)社会支持方面,家属、亲朋好友以及看护人员要充分的给予病患鼓励和支持,多与其进行沟通。

1.3 观察指标

观察两组患者回归社会的生活质量,了解两组患者看护过程中粗线的护理差错;了解两组患者对护理满意度的比较。

1.4 统计学方法

本次研究所涉及的数据和指标、各种护理干预措施效果等等,在经过整合统计之后,双人核对、录入,数据应用 SPSS22.0 统计软件进行分析,计数资料组间比较进行检验,等级资料以采用非参数,检验计量进行 t 检测检验。检验水准以 $P < 0.05$ 提示差异具有统计学意义。

2 结果

在使用不同的看护方式来进行具体的看护操作之后,患有妇产科病患最终的看护差错发生率和看护满意度这两项指标之间都存在较大的差异,差异有统计学意义 ($P < 0.05$),详见表 2、3。

表 2 两组患者看护的容错率对比 (%)

组别	例数	发生	没有发生	护理差错
研究组	50	20	30	40%
对照组	50	35	15	70%
X^2				13.091
P				<0.05

(下转第 41 页)

表 2.比较两组患者治疗效果[n (%)]

组名	例数(n)	治愈	显效	有效	无效	总有效
对照组	52	8(15.38%)	16(30.77%)	15(28.85%)	13(25%)	39(75%)
观察组	50	12 (24%)	20 (40%)	14 (28%)	4(8%)	46(92%)
X ² 值	-	-	-	-	-	5.304
P 值	-	-	-	-	-	0.021

3 讨论

妊娠期高血压是孕产妇及围产儿死亡的重要原因之一。目前暂未明确妊娠期高血压的发病过程,大部分认为疾病发生是因为遗传因素、免疫反应、胎盘缺血、机体氧化应激等多种因素相互作用引起的^[3]。硫酸镁在临床上是常用的抗惊厥药物,它里面含有镁离子成分,可以抑制乙醇胆碱释放及中枢神经活动,抑制住患者肌肉收缩,促进患者平滑肌舒张,改善抽搐、痉挛的现象,降低血压^[4],但硫酸镁降压效果并不明显。拉贝洛尔能够有效降低血管阻力,促进血管扩张、平滑肌舒张,减少心肌耗氧及心脏负荷,来降低血压。采取拉贝洛尔

与硫酸镁联合治疗的观察组,治疗后的舒张压收缩压均有明显的降低,且治疗后观察组有效率达到了 92% (P<0.05)。

如上,对妊娠期高血压患者采取拉贝洛尔与硫酸镁联合治疗效果显著,不仅降低了患者的血压,并且效果显著,非常值得在临床推广。

参考文献:

[1]张瑞芳.联用拉贝洛尔和硫酸镁治疗妊高症的效果研究[J].当代医药论丛,2020,18(3):163-164.

[2]郭丹.拉贝洛尔联合硫酸镁治疗妊娠期高血压的临床观察[J].中国医药指南,2020,18(10):109-110.

[3]杨丹.盐酸拉贝洛尔联合硫酸镁治疗妊娠期高血压的效果评价[J].当代医药论丛,2020,18(6):145-146.

[4]张爱华.拉贝洛尔联合硫酸镁治疗重度妊娠期高血压的临床效果分析[J].系统医学,2020,5(5):114-116.

通讯作者:王光友 女 1973 年 4 月 26 日 副主任医师 重庆市綦江区人民医院产科

(上接第 39 页)

表 3 两组患者对护理满意度对比 (%)

组别	例数	满意	一般满意	不满意	满意度 (%)
研究组	50	35	10	5	90%
对照组	50	20	10	20	60%
X ²					13.091
P					<0.05

3 讨论

3.1 存在的安全隐患

3.1.1 护理人员法律意识淡薄:妇产科护理员在实际护理过程中,会直接或间接导致护理纠纷,造成安全事故的原因主要有:妇产科护理员缺乏一定的应急措施和危机意识;由于护理员在实际操作中很容易忽略一些潜在的隐患,以及一些危险因素,从而引发一系列的护理员安全事故。

3.1.2 护理人员看护制度及流程不熟悉:有些护理员在对病人进行特殊的护理操作时,经常会出现不严格执行原始操作规程的情况,造成药物管理混乱,操作不规范,甚至出现病人病情变化不及时被发现,从而造成抢救时间延误,从而引发护理事故和纠纷。

3.1.3 护理人员专业水平较低:由于社会的发展,人们对看护人员的专业操作技能水平的要求在不断提高,而看护人员对自己的专业操作技能水平却没有及时更新和提升,因此看护人员的操作不规范、不合格等情况也是造成护患纠纷的一个重要原因。

3.1.4 缺少医患交流:常言道,良好的人际关系都是建立在沟通

的基础上的,可是有些护理员没有掌握与病人交流的技巧,经常出现词语不达意的情况,让病人对护理员的服务态度不好而引发医疗纠纷。而对病人提出的问题,护士也会随随便便地作出回答,并不能真正地为客户提供解决问题的方法。

3.2 可以采取的安全措施

3.2.1 加强护理人员法律意识:为了能使护理员成为懂法律、守法的好公民,使护理员真正了解在工作过程中存在的法律责任问题,医院需要组织护理员学习各种法律法规,如执业护士法、医疗事故处理条例等。并且可以在此基础上制定相关的安全管理制度,加强日常的操作过程管理。

3.2.2 提高护理人员专业水平:妇产科的护理内容要求护理员具有较高的专业技能,因此要求护理员具有较高的业务素质及应急能力。此时院方可定期向护士提供业务学习操作技能培训渠道,使她们及时掌握专业技能和操作技能,不断提高操作技能。

3.2.3 加强住院教育:病患在接受住院治疗后,护理人员需要对病患及其家属进行住院教育,其中主要包括:向患者介绍住院规章制度的重要性;强调特别注意事项;对病患家属说明遵医嘱的重要性。

参考文献:

[1]董皎.浅析妇产科护理中常见的隐患及控制对策[J].实用妇科内分泌电子杂志,2019,6(24)

[2]劳玉翠,何金杏.浅析妇产科护理安全隐患与对策[J].饮食保健,2019,006(051)