

# 浅谈急救护理措施在骨科多发伤患者救治中的作用

李玉

陕西省人民医院 710068

**摘要:** 本文主要研究急救护理措施对骨科多发伤患者的治疗效果; 2015 年 7 月至 2017 年 7 月在我院进行常规急救护理治疗的骨科选择了 110 名多发伤患者作为对照组, 2017 年 7 月至 2019 年 7 月在我院 110 例多发伤患者进行急救护理治疗作为观察组, 采用规范化急救护理治疗, 比较了两组患者的临床护理效果。结果: 观察组与对照组的救护车到达时间和接受手术时间有显著差异,  $P < 0.05$ , 具有统计学意义。结果观察组的急救护理成功率明显高于对照组,  $P < 0.05$ , 结果差异有统计学意义。结论: 针对骨伤多发伤患者的规范化急救护理措施可以有效提高患者治疗效率, 并积极提高患者抢救成功率, 具有重要意义。

**关键词:** 急救护理措施; 科多发伤患者; 救治作用

多发伤是由致伤原因引起的对多个部位或器官的严重伤害。多发伤的特点是重伤、疾病迅速、变化迅速、死亡率高。因此, 及时、准确、规范、有效的急救多发伤患者护理与他们的预后直接相关。

## 一、资料与方法

### (一) 临床资料

选择 2015 年 7 月至 2017 年 7 月在我院急诊就诊的骨伤多发伤患者 110 例作为对照, 男 74 例, 女 36 例, 年龄 1-79 岁, 平均年龄  $49.5 \pm 5.6$  岁, 53 例开放性损伤和 57 例闭合性损伤。2017 年 7 月至 2019 年 7 月在我院接受急救治疗的多发伤手术中有 110 例患者作为观察组, 33 名女性, 77 名男性, 年龄在 1 至 80 岁之间, 平均年龄为  $49.8 \pm 5.4$  岁, 其中 51 人为开放性伤害, 59 人为闭合性伤害。两组患者在年龄, 性别和伤害类型方面无显著差异, 并且具有可比性。

### (二) 方法

对照组患者接受常规急救护理, 包括评估患者的病情并及时输血或输液治疗, 观察组患者的规范化急救护理措施:

首先, 入院前急救护理; 当命令救护车出车时, 腰向警察了解患者的基本情况, 根据所获信息准备简单的治疗材料, 并在随后的时间内给患者进行简单的救护, 观察患者的特定创伤部位, 不阻塞患者的呼吸道, 并在护送患者的同时向医院报告病情, 以便医护人员可以采取行动。其次, 院内急救: 详细评估患者的病情, 并根据病情的严重程度进行分级, 并对重症患者进行即时护理。仔细监测重症患者的重要体征并优先处理。在常见的急诊和重症地区进行治疗后进行诊断和治疗, 一般急救患者被转移到普通急诊和轻度地区进行治疗。然后根据患者的具体情况清除口腔分泌物和血块, 并保持呼吸道通畅。使患者的头部倾斜到一侧, 采取紧急措施, 例如吸入氧气, 并根据需要进行气管插管。它可以快速建立患者的静脉输液途径, 并及时为患者补充必要的液体。仔细监测患者的基本生命特征, 积极准备手术, 稳定安慰情绪异常的患者, 并为急救手术做准备。第三, 手术护理。护理人员必须充分准备手术用品和仪器, 以进行患者评估和基本治疗, 例如氧气吸入和静脉输液。对于重症和重病者, 应在入院后 1 小时内进行手术抢救治疗。手术期间, 积极配合医生的各种治疗性手术, 以增加患者的生存机会。

### (三) 统计处理

与这项研究相关的所有数据都必须输入 SPSS 17.0 统计软件进行统计分析。计数数据表示为数据处理期间的百分比, 并且组之间的比较以  $\chi^2$  进行测试。测量数据用  $(\bar{x} \pm s)$  表示,  $t$  检验用于比较两个组的数据,  $P < 0.05$ , 则认为两组之间的结果差异具有统计学意义。

## 三、结果

### (一) 两组患者组之间的治疗时间比较

从表 1 中可以看出, 观察组与对照组之间的救护车到达时间和手

术时间存在显著差异,  $P < 0.05$ , 结果具有统计学意义,

### (二) 两组患者抢救成功率的比较

观察组患者的抢救成功率为 92.73% (102/110), 对照组患者的抢救成功率为 80.91% (89/110)。观察组抢救成功率明显高于对照组,  $P < 0.05$ , 差异有统计学意义。

表 1 两组患者接受救治时间比较  $(\bar{x} \pm s)$

组别	n	救护车到达时间	接受手术时间
观察组	110	$15.21 \pm 1.59$	$59.22 \pm 26.73$
对照组	110	$19.89 \pm 2.23$	$98.76 \pm 35.43$

## 三、讨论

多发性骨伤主要由高能量电击引起, 具有以下特征: 重病, 进展迅速; 多发伤部位以及闭合性和开放性损伤并存; 不同系统损伤的症状和综合症相互影响; 过于注意容易开放性伤害可能导致误诊和闭合性伤害诊断失败。由于该病严重且进展迅速, 因此随时可能危及患者生命, 及时有效的急救护理对于手术至关重要。

从骨科多发伤特点和医院急救程序中来看, 抢救时间与最佳治疗时间有关, 最大限度地减少抢救时间的方法就是医院的急救护理系统。近年来, 标准化的急诊医学已广泛用于临床急诊治疗, 从救护车到急诊室的所有患者转移程序均已标准化, 每个参与者应遵循标准化程序以提供紧急护理, 并消除影响效率的系统和减少救援时间并获得最佳的治疗机会。创伤急救将挽救忍者的生命并最大限度地提高其生理机能, 及时有效的护理合作对于救援行动至关重要, 因为受伤的人可随时迅速改变病情并危及生命。在对多发伤人员进行急救的过程中, 科学, 标准化的急救措施可以改善成功救助的逐步保证。到达急诊室后, 护士需要快速而准确地评估他们的病情, 并采取准确的急救措施。多发伤患者的救治率仅限于多个科室, 护士需要按预期与其他部门协调工作, 有关科室在救治患者时进行会诊。同时, 观察患者的病痛和悲伤的变化, 做好一切准备, 并积极与患者和家属进行沟通。减轻心理负担, 使患者能够积极配合治疗。

### 参考文献:

[1]杜旭航,魏润玲.规范化急救护理措施在骨科多发伤患者救治中的效果观察[J].临床医药文献电子杂志,2020,7(07):85-86.

[2]魏润玲.来满满.规范化急救护理措施在骨科多发伤患者救治中的应用[J].临床医药文献电子杂志,2019,6(70):117+127.

[3]高珊.急救护理措施在骨科多发伤患者救治中的作用[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(56):280+282.

姓名:李玉 出生年月:1990.12 性别:女 籍贯:陕西省汉中市 民族:汉 学历:本科 职称:主管护师 研究方向:骨科护理 单位:陕西省人民医院 邮编:710068